

醫

燈

續

焰

醫燈續燭目錄

卷之六

勞極脉證第五十一

四君子湯

見第十六

補中益氣湯

見第三十

參朮膏

四物湯

見第二十一

六味地黃丸

見第十六

八珍湯

見第十六

聖愈湯

濟生續斷湯

木瓜散

鹿角丸

保命金剛丸

丹溪虎潛丸

保命黑地黃丸

資生丸

卽大啓脾丸

楊氏還少丹

龜膠

鹿膠

保和丸

見第十七

平胃散

見第四十四

元戎逍遙散

腎着湯

見第二十一

金匱腎氣丸

見第十六

寶鑑天真丹

小青龍湯

見第十六

麻黃湯

見第十六

夢授天王補心丸

朱砂安神丸

見第十九

朱雀丸

和劑人參養榮湯

失血脉證第五十二

瘀血脉證第五十三

桃仁承氣湯

見第二十

仲景大黃廩虫丸

精濁脉證第五十四

知藥八味丸

河間秘真丸

豬肚丸

清心蓮子飲

見第四十九

草薺分清飲

六味地黃丸

見第十六

導赤散

見第十七

六一散

見第四十四

三消脉證第五十五

金匱猪苓湯

仲景人參白虎湯

見四十三

子和加減三黃丸

和劑涼膈散

和劑酒煮黃連丸

六一散

見第四十四

大黃黃連瀉心湯

六味地黃丸

見第十六

固本丸

知藥八味丸

見第五十四

小便淋瀝脉證第五十六

局方石韋散

三因石燕丸

瞿麥湯

沉香散

鹿角霜丸

兔絲子丸

黃耆湯

補中益氣湯

見第二十九

立効散

濟生小蘗子飲

肉蓯蓉丸

八味地黄丸

見第十六

六一散

見第四十四

本事火府丹

導赤散

見第十七

局方八正散

見第四十

卷之七

大便燥結第五十七

局方麻仁丸

局方即和劑

四物湯

見第三十一

東垣導滯通幽湯

得効五仁丸

得効皂莢丸

聖惠搜風順氣丸

濟生薤白潤腸丸

大承氣湯

見第十七

小承氣湯

見第十七

四君子湯

見第十六

八珍湯

見第十六

十全大補湯

見第十六

六味地黃丸

見第十六

八味地黃丸

見第十六

六磨湯

得効橘杏丸

蘇麻粥

黃耆湯

六一散

見第四十四

局方半硫丸

枳實理中湯

見第十七

癲狂脉證第五十八

靈苑辰砂散

歸脾湯

人參琥珀丸

補中益氣湯

見第三十九

仲景四逆散

鐵甕申先生交感丹

附降氣湯

桃仁承氣湯

見第二十一

代抵當丸

見第二十一

逍遙散

見第五十一

天王補心丸

見第五十一

朱雀丸

見第五十一

白虎湯

見第四十三

大承氣湯

見第十七

小承氣湯

見第十七

涼膈散

見第十九

紫雪

滾痰丸

見第十七

琥珀壽星丸

瀉青丸 見第四十九

癰病脉證第五十九

集驗龍腦安神丸 見第十九

河間犀角丸 見第二十五

清心牛黃丸 見第四十二

神應丹

三聖散

大承氣湯 見第十七

喉痺脉證第六十

和劑甘桔湯

三因荊芥湯

和劑解毒雄黃丸

寶鑑碧玉散

寶鑑開關散

瓜蒂散

見第四十八

寶鑑備急如聖散

咽喉備急丹

寶鑑增損如聖散

瑞竹羅青散

燒鹽散

四七湯

見第十七

四味湯

白礬散

卷之八

眩暈脉證第六十一

芩薊散

東垣羌活湯

涼膈散

見第十九

防風通聖散

見第四十

東垣半夏白朮天麻湯

見第二十二

滾痰丸

見第十七

玉液湯

四物湯

見第二十一

補中益氣湯

見第三十

頭痛脉證第六十二

桂枝湯

見第十九

玄珠茶調散

見第二十二

麻黃湯

見第十六

九味羌活湯

見第十六

瀉青丸

見第四十九

二仙散

對金散

神芩丸

見第十七

涼膈散

見第十九

奇効芩朮湯

半夏白朮天麻湯

見第二十二

瓜蒂散

見第四十八

紅豆散

局方玉壺丸

補中益氣湯

見第三十九

六君子湯

見第十六

四物湯

見第二十一

逍遙散

見第五十一

六味地黃丸

見第十六

八味地黃丸

見第十六

心腹痛脉證第六十三

二陳湯

見第十六

丹溪海蛤丸

前胡半夏湯

正傳加味枳朮丸

香砂平胃散

見第十四

香蘇散

見第四十八

參蘇飲

見第四十七

五積散

見第三十七

蘇合香丸

見第十八

統旨清中湯

越鞠丸

見第四十一

左金丸

見四十九

黃耆建中湯

見第二十一

補中益氣湯

見第三十

六君子湯

見第十六

金匱九痛丸

神効剪紅丸

蕪荑散

仲景烏梅圓

萬應丸

集効丸

仲景備急丸

見第三十五

紫金錠

卽玉樞丹

四七湯

見第十七

枳桔二陳湯

見第四十八

平胃散

見第四十四

東垣溫胃湯

來復丹

見第十七

理中湯

見第十七

東垣天台烏藥散

半硫丸

見第五十七

烏藥順氣散

鐵窠申先生交感丹

見第五十八

溫膽湯

見第二十一

小柴胡湯

見第四十三

醫燈續焰卷六

錢塘後學潘 楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人

王元機樞伯

校

蔣式金子如

勞極脉證第五十一

勞極諸虛。浮。與微弱。土敗雙弦。火炎急數。

勞極者。五勞六極也。巢氏病原云。五勞者。一曰志

勞也。五藏疲

勞。二曰思勞。三曰心勞。四曰憂勞。五曰瘦勞。

瘦當是肝

勞

又云。肺勞者。短氣而面腫。鼻不聞香臭。肝勞者。

面目乾黑。口苦。精神不守。恐畏不能獨卧。目視不

明。心勞者。忽忽喜忘。大便苦難。或時鴨溇。口内生

瘡。脾勞者。舌苦直。不得咽唾。腎勞者。背難以俛仰。

小便不利。色赤黃而有餘瀝。莖內痛。陰濕囊生瘡。

小腹滿急。此五勞各見五藏氣化。及經絡諸證。亦

甚明顯。但與前五勞不甚符合。姑存此。俟再考也。

以手血脈肌  
 所為五  
 所為足  
 氣子所  
 虛則氣  
 子所合  
 也皆聚有  
 云六極

六極者。一曰氣極。令人肉虛。五藏不足。邪氣多。正

氣少。不欲言。宜四君子湯補中益氣湯參朮膏之類二曰血極。令人

無顏色。眉髮墮落。忽忽喜忘。宜四物湯六味丸八珍湯聖愈湯之類

三曰筋極。令人數轉筋。十指爪甲皆痛苦倦。不能

久立。宜四物湯聖愈湯劑生續斷湯木瓜散之類四曰骨極。令人痠削。

齒苦痛。手足煩疼。不可以立。不欲行動。宜六味丸鹿角丸保

命金剛丸丹溪五曰肌極。令人羸瘦無潤澤。飲食

不生肌膚。宜四君子湯保命黑地黃丸資生丸之類六曰精極。令人少

氣踰踰然內虛。五藏氣不足。髮毛落。悲傷喜忘。

宜六

味毛還少丹  
龜鹿膠之類

是卽五藏所合之病。虛損而至于極

處者也。腎則多一精極。故爲六極。其證與五藏配

合。甚爲有理。此巢氏之三昧論也。諸虛者。言一切

虛損不足。卽五勞六極。更有七傷。俱該在內。巢氏

云七傷者。一曰陰寒。二曰陰萎。三曰裏急。四曰精

連連。五曰精少。陰下濕。六曰精清。七曰小便苦數。

臨事不卒。又云七傷者。一曰大飽傷脾。脾傷善噫。

五分  
各則

欲卧面黃

宜資生丸保和丸平胃散之類

二曰大怒氣逆傷肝肝

傷少血目闇

宜四物湯元戎逍遙散之類

三曰強力舉重久坐

濕地傷腎腎傷少精腰背痛厥逆下冷

宜黑地黃丸腎着湯

人味丸寶鑑

四曰形寒寒飲傷肺肺傷少氣欬嗽

鼻鳴

宜小青龙湯麻黃湯之類

五曰憂愁思慮傷心心傷苦驚

喜忘善怒

宜天王補心丸朱砂安神丸朱雀丸之類

六曰風雨寒暑傷

形形傷髮膚枯天

宜人參養榮湯之類

七曰大恐懼不節傷

志

言大恐懼而不節于慾也

志傷恍惚不樂

宜天王補心丸安神丸之類

是

病虛脈弱治  
新從補若雙  
我愚敬則正  
衰邪實補劑  
施於云不

云七傷亦合于五藏。但多一形志。故云七傷較前  
所云七傷。此爲得理。蓋前七傷大抵俱屬腎證。人  
身感疾。觸處可傷。豈獨一腎。若云腎有七傷。則可  
正文不言七傷。而註錄者欲其便于查考耳。夫勞  
極損傷。氣血日耗。形體漸衰。所見之脈。隨病呈象。  
如空虛之浮。不鼓之爽。欲絕之微。無力之弱。雖云  
病脈。然與病猶相宜也。至若雙弦。乃知土敗。急數  
定爲火炎。蓋弦爲肝木。雙弦則木太盛。久病之士。

何堪其侮。故知其必敗也。數已爲熱。急數則躁疾。直強。略無半點和柔。邪火炎炎。真陰自絕。兩皆不治之證。

附方

四君子湯

見第十六

補中益氣湯

見第三十九

參朮膏

治中風虛弱。諸藥不應。或因用藥失宜。

耗散元氣。虛證蜂起。但用此藥。補其中氣。諸證

自愈。

人參

白朮

各等分

右水煎稠收膏。湯化服之。

四物湯

見第二十一

六味丸

見第十六

八珍湯

見第十六

聖愈湯

治一切失血。或血虛煩渴躁熱。睡卧不

寧。或瘡證膿水出多。五心煩熱作渴等證。

熟地黄 生者自製

生地黄

當歸 酒拌各一錢

人參一

黃耆 炒

川芎 各二錢

右水煎服

濟生續斷湯 治肝勞虛寒脇痛脹滿攣縮煩悶

眼昏不食。

川續斷 酒浸

川芎

當歸 酒浸去蘆

陳皮 去白

半夏 製

乾薑 炮各一兩

肉桂 不見火

炙甘草 各半兩

咬咀。每服四錢。水一盞。薑五片。煎服無時。

木瓜散 治筋虛極。脚手拘攣。十指甲痛。數轉筋。

甚則舌卷。卵縮。唇青面黑。

木瓜

去子

虎脰骨

酥炙

丑加皮

洗

當歸

酒浸

桑寄生

酸棗仁

炒

人參

柏子仁

黃耆

各一兩

炙甘草

一兩

煎服法同前。

鹿角丸 治骨虛極。面腫垢黑。脊痛不能久立。血

氣衰憊。髮落齒枯。甚則喜唾。

鹿角

二兩

牛膝

酒浸焙去  
塵一兩半

右爲細末。煉蜜丸如梧子大。每服七十丸。空心  
鹽湯下。

保命金剛丸 治腎損骨痿不能起于床。宜服此

益精。

草薢

杜仲

絲炒去

菴蓉

酒浸

兔絲子

酒浸各等分

右爲細末。酒煮猪腰子。搗和丸如桐子大。每服五七十丸。空心用溫酒送下。

丹溪虎潛丸

龜板

黃蘗

各四兩

知母

熟地黃

各二兩

牛膝

各三兩

芍藥

各一兩

瑣陽

虎骨

酥炙

當歸

各一兩

陳皮

七錢半

乾薑

半兩

右爲末。酒糊丸。加附子。治痿厥如神。

保命黑地黄丸

加五味子爲腎氣丸

治陽盛陰衰。脾胃不

足。房室虛損。形瘦無力。面多青黃而無常色。此

補氣益胃之劑也。

蒼朮

一斤 泔浸

熟地黄

一斤 酒蒸 搗如泥

五味子

半斤

乾薑

秋冬一兩 夏半兩 春七錢

右爲細末。聚肉丸。如桐子大。食前米飲。或酒服。

百丸。治血虛久痔甚妙。經云。腎苦燥。急食辛以

治胃日東垣  
胃壯元氣  
則能食而  
不饑過時而  
傷此丸能  
饑者飽飽  
者壯胃故  
能觀病中消

潤之。此藥開腠理。生津液。通氣。又五味子酸以收之。此雖陽盛而不燥熱。乃是五藏虛損于內。故可益血收氣。此藥類象神品方也。

資生丸 健脾胃。消食止瀉。調和藏府。滋養榮衛。王肯堂先生曰。余初識繆仲淳時。見袖中出彈丸咀嚼。問之曰。此得之秘傳。饑者服之。即飽。飽者服之。即饑。因疏其方。余大善之。而頗不信。其消食之功。已于饑飽後。頓服二丸。徑投枕臥。

夙興了無停滯始信此方之神也先恭簡年高  
脾弱食少痰多餘齡葆攝全賴此方因特附著  
于此與世共之

白朮

米泔水浸用山黃土拌蒸九次  
晒九次去土切片焙乾三兩

人參

去蘆人乳浸透飯  
鍋上蒸熟三兩

白茯苓

去粗皮  
水飛去

筋膜人乳拌飯鍋上  
蒸熟晒乾一兩五錢

橘紅

山查肉

炒

神麴

炒各  
二兩

川黃連

薑汁  
炒

白荳蔻仁

微  
炒

澤瀉

去毛炒各  
三錢半

桔梗

米泔  
浸炒

真藿香

洗

甘草

蜜炙去皮  
各五錢

白扁豆

去殼炒

蓮肉

去心皮  
各一兩

薏苡仁

淘淨炒  
三兩

乾山藥

炒

麥芽麵

炒

芡實

淨肉炒各  
一兩五錢

末之。煉蜜丸。每丸二錢重。每服一丸。醉飽後二  
丸。細嚼。淡薑湯下。

楊氏還少丹

大補心腎脾胃。一切虛損。神志俱

耗。筋力頓衰。腰脚沉重。炭體倦怠。血氣羸乏。小

便渾濁。

乾山藥

牛膝

酒浸

遠志

去心

山茱萸

去核

白茯苓

去皮

五味子

巴戟

酒浸去心

肉蓯蓉

酒浸一宿

石菖蒲

楮實

杜仲

去粗皮薑汁酒拌同炒斷絲

舶茴香

各一兩

枸杞子

熟地黃

各二兩

此據寶鑑所定。攷楊氏原方。山藥牛膝各一兩

半。茯苓茱萸楮實杜仲五味巴戟蓯蓉遠志茴

香各一兩。菖蒲地黃枸杞各半兩。

右爲細末。煉蜜同棗肉爲丸。如桐子大。每服三十丸。食前溫酒。或鹽湯下。日三服。五日覺有力。十日精神爽。半月氣壯。二十日目明。一月夜思飲食。冬月手足常暖。久服令人身體輕健。筋力壯盛。悅澤難老。更看體厚加減。如熱加山梔。兩心氣不寧。加麥門冬。兩一少精神。加五味子。兩一陽弱加續斷。兩一常服固齒。無瘡癰。婦人服之。容顏悅澤。煖子宮。去一切病。

治諸虛百損精少髓枯腎衰水道竭乏血  
治最切

龜膠 治諸虛百損精少髓枯腎衰水道竭乏血

液乾涸。一切陰不足之證。

龜殼十斤。或數十斤。水浸五七日。視上黑皮浮起。卽取刮淨純白。如灼過。以刀剗去焦跡。再洗淨。石臼中搗碎。入磁罈中包固。再坐大鍋中。隔水煮。水乾。旋以溫水添足。不斷火。一二晝夜。視板酥爛。汁稠。濾去板滓。將汁入錫鍋。或磁鍋。桑火緩緩熬收。不住攪動。至滴水不散。用銅杓

性味甘平鹿為  
 陽氣通於  
 精生無兩月  
 通可廿片陽  
 固聚於頭  
 其易且  
 也故凡真  
 不足者用  
 為効頗捷  
 鹿合用  
 仙膠

堯入磁器中。冷即成餅。每服不拘多少。滾水溫  
 酒任化下。

鹿膠 治陽衰。形羸體瘦。少氣困乏。力減神疲。或  
 精冷無子。及一切虛寒陽不足之證。

嫩鹿角不拘多少。寸截浸水數日。去粗皮。隔水  
 煮如龜板法。服法亦同。但角堅硬。必煮一日。方  
 搗碎。再入鐺煮收如上。俱宜臘月水煮。庶膠經  
 久不臭。若二膠合服。陰陽兩補。更妙也。

丹溪保和丸

見第十七

平胃散

見第四十四

元戎逍遙散

治血虛勞倦。五心煩熱。肢體疼痛。

頭目昏重。心怔煩赤。口燥咽乾。發熱盜汗。減食。

嗜卧。及血熱相搏。月水不調。臍腹脹痛。寒熱如。

瘧。又療室女榮衛不和。痰嗽潮熱。肢體羸瘦。潮。

成骨蒸。

加山梔牡丹皮  
名加味逍遙散

白茯苓

去皮

白朮  
炒

當歸

白芍藥炒

柴胡各一兩

甘草半兩

右咬咀。每服四錢。水一鐘。煨生薑一塊切片。煎至六分。去滓。熱服。無時。

腎着湯 見第二十一

金匱腎氣丸 見第十六

寶鑑天真丹 治上焦陽虛

沉香 穿心巴戟 酒浸

藿香炒

草薢酒浸炒

葫蘆巴炒香

破故紙炒香

杜仲焚炒去絲

琥珀

黑牽牛鹽炒去

兩

官桂半兩

右十味爲末。用清酒打糊爲丸。如桐子大。每服五十丸。空心溫酒送下。鹽湯亦可。

仲景小青龍湯見第十六

仲景麻黃湯見第十六

天王補心丸 寧心保神。益血固精。壯力強老。令

人不忘。除怔忡。定驚悸。清三焦。化痰涎。祛煩熱。

療咽乾。育養心神。

人參

去蘆  
五錢

當歸

酒浸

五味子

麥門冬

去心

天門冬

去心

柏子仁

酸棗仁

各一兩

白茯苓

去皮

玄參

丹參

桔梗

遠志

各五錢

生地黃

四兩

黃連

酒洗炒  
二兩

右爲末。煉蜜丸如桐子大。朱砂爲衣。每服二三  
十丸。臨卧燈草竹葉煎湯下。

朱砂安神丸

見第十九

朱雀丸

一百

治心腎不交。心神不定。事多健忘。

沉香

半兩

茯神

二兩

右爲細末。蜜丸如小豆大。飛朱砂爲衣。每服三十丸。食後用人參湯下。

和劑人參養榮湯

治脾肺俱虛。發熱惡寒。肢體

瘦倦。食少作瀉等證。若氣血虛而變見諸證。勿論其病。勿論其脈。但服此湯。其病悉退。

脈自來注  
無所確指

白芍藥

陳皮

人參

黃耆蜜炙

桂心

當歸

白朮

甘草炙各一錢

熟地黃

五味子炒杵

白茯苓去皮各七分半 遠志去心五分

右薑棗水煎服

失血脉證第五十二

諸病失血。脉必見芤。緩小可喜。數大可憂。

衛行脉外。榮行脉中。凡失血之病。脉中必空。故見

以管衛中  
脈了然

其氣四  
不  
其氣  
其氣  
其氣必

芤象。若緩小不足。與病相宜。是可喜也。脈數而大。邪盛正衰。且爲火象。必燦真陰。誠爲大可憂者。

瘀血脉證第五十三

瘀血內畜。却宜牢大沉小澁微。反成其害。

血畜于內。瘀凝不行。瘀凝則脈大。不行則脈牢。亦因病呈象也。逐之使去。巢穴一空。而致新不難矣。  
宜桃仁承氣湯或丹皮紅花之類  
設脈沉小澁微。是病有餘而脈反不足。病有物而脈若無物。雖云瘀血。亦不過着

于經絡。如仲景所云榮衛氣傷。內有乾血之類。似非瘀畜于一處者。故脉見如斯。補之有礙。逐之不能。是反成其害也。

宜大黃  
廬虫丸

附方

仲景桃仁承氣湯

見第二十

仲景大黃廬虫丸

結在內者。手足脉必相失。宜

此方。然必兼大補劑。瓊玉膏之類服之。

大黃

十分古以二錢半爲  
一分當是二兩半蒸

黃芩

二兩

甘草 三兩

桃仁 一升

杏仁 去皮尖 一升

地黃 十兩

芍藥 四兩

乾漆 一兩

蜚虫 一升

水蛭 百枚

蟻螬 一升

麤虫 半升

右十二味末之。煉蜜爲丸。小豆大。酒飲服五丸。

日三服。

精濁脉證第五十四

遺精白濁。微瀉而弱。火盛陰虛。耗濡洪數。

補白濁固

平焦症候

卷中焦脂

不運以致

精下陷濕

奮勝者爲

藥亦宜

卷一

精道濁

漸迫二者

有分別

腎主藏精。慾後方爲施泄。今或念動卽出。或無慾

自遺此皆腎虛不能藏攝故耳。宜知柏八味丸河間秘真丸猪肚丸

白濁者。小便色白而濁。亦爲腎虛胞冷。不能分

清所致宜清心蓮子飲草形屬精液。證屬脫亡。脉

安得不微瀆而弱也。設見乳濡洪數之脉。乳濡固

爲陰虛而洪數實因火盛火盛則精遺火盛則便

濁似與腎之虛。胞之寒。而不能藏。不能別者。大徑

庭矣臨診可經乎哉

方甚多  
 不出于  
 有夢而  
 者思起  
 致心虛  
 元有無  
 行時多  
 中則能  
 而通者  
 不升  
 不運也  
 提之則  
 其自有要  
 矣

附方

知母八味丸

即六味丸加知母黃蘗

河間秘真丸。治白淫。小便不止。精氣不固。或有

餘瀝。及夢寐陰人通泄。

龍骨

一兩

大訶子皮

五枚

縮砂仁

半兩

硃砂

一兩研細。一分為衣。

右為末。麴糊丸。葉豆大。每服一二十丸。空心溫

酒熱水任下。不可多服。

猪肚丸 治醉飽後遺精神効

牡蠣

煨另研極細

白朮

各四兩

苦參

三兩

猪肚一具

煮極爛去油膜搗如泥

右前三味。搗篩極細。同猪肚搗數百杵。令極勻。燥畧增肚汁。丸如桐子大。每服五十丸。空心米飲送下。不但治遺滑。卽勞瘦者亦能肥也。

清心蓮子飲

見第四十九

單解分清飲

治真元不固。不時白濁。或小便赤澀。

數凝如膏糊等證。

益智仁

川草薢

石菖蒲

烏藥

各等分

右咬咀。每服四錢。水一盞。入鹽一捻。煎七分。食前溫服。一方加茯苓甘草。

六味丸

見第十六

錢氏導赤散

見第四十九

六一散

見第四十四

三消脈證第五十五

三消之脈。浮大者生。細小微瀉。形脫可驚。

三消者。上中下也。渴而多飲爲上消。素問氣厥論

謂之鬲消。

宜金匱猪苓湯人參白虎湯子和加減三黃丸涼膈散酒煮黃連丸六一散之

類。消穀善饑爲中消。素問脈要精微論謂之消中。

宜酒煮黃連丸大黃黃連屬心湯山梔黃連之類

渴而便數有膏爲下消。

素問氣厥論謂之肺消。飲一溲二。後人又謂之腎

消。宜六味丸四苓丸斐全善亦云。腎消者。飲一溲

消渴乃腎氣  
周于胸也  
結明可療久  
前腎水乾枯  
此陽獨治十  
難一生者矣

二。其漉如膏油。卽膈消消中之傳變。總不外火燥真陰。津液燥竭。自古論之者多矣。唯劉河間張戴人二論。辭義暢達。最爲中綮。茲錄于左。河間曰。五藏六府四肢。皆稟氣于脾胃。行其津液以濡潤養之。然消渴之病。本濕寒之陰氣極衰。燥熱之陽氣太盛故也。治當補腎水陰寒之虛。而瀉心火陽熱之實。除腸胃燥熱之甚。濟身中津液之衰。使道路散而不結。津液生而不枯。氣血和而不滯。則病自

已矣。况消渴者。因飲食服餌之失宜。腸胃乾涸而氣不得宣平。或精神過違其度而耗亂之。或因大病。陰氣損而血液衰。虛陽慄悍而燥熱鬱甚之所成也。若飲水多而小便多。名曰消渴。若飲食多。不甚渴。小便數而消瘦者。名曰消中。若渴而飲。不絕。腿消瘦而小便有脂液者。名曰腎消。一皆以燥熱太甚。三焦腸胃之腠理。怫鬱結滯。致密壅滯。復多飲于中。終不能廣潤于外。榮養百骸。故渴不止。

小便多出。或數溲也。戴人之論。則曰。火能消物。火  
木則爲炭。燔金則爲液。燔石則爲灰。煎海水則爲  
鹽。鼎水則乾。人之心腎爲君火。三焦膽爲相火。得  
其平。則烹煉飲食。糟粕去焉。不得其平。則燔灼藏  
府。而津液耗焉。夫心火甚于上。爲膈膜之消。甚于  
中。爲腸胃之消。甚于下。爲膏液之消。甚于外。爲肌  
肉之消。上甚不已。則消及于肺。中甚不已。則消及  
于脾。下甚不已。則消及于肝腎。外甚不已。則消及

于筋骨。四藏皆消盡。則心始自焚而死矣。故知消渴一證。調之而不下。則小潤小濡。固不能殺炎上之勢。下之而不調。亦旋飲旋消。終不能沃膈膜之乾。下之調之。而不減滋味。不戒嗜慾。不節喜怒。則病已而復作。能從此三者。消渴亦不足憂矣。二八此論。消渴之因證。可謂旣明且悉。不煩再解。但甘脉浮大者。尚屬彌漫寬散。前河間云。使道路散而不結。津液生而不枯。氣血和而不澁。則病自已。

然非彌漫寬散之氣機。不能得此不結不枯不澀之病機耳。故云浮大者生。若脉細小浮濇。則氣血之虛衰枯槁。不言可知。再加身體瘦悴。是謂形脫。卽戴人所云木爲炭。金爲液。石爲灰。水爲鹽。鼎水乾之義。形氣兩敗。豈直可驚已哉。

附方

全匱猪苓湯 治發熱渴欲飲水小便不利。

猪苓

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉

各一兩

右五味。以水四升。先煮四味。取二升。去滓。內膠。洋消。溫服七合。日三服。

仲景人參白虎湯

見第四十三

子和加減三黃丸

治丹石毒。及熱渴。以意測度。

須大實者方用。

黃芩

春四兩。夏秋六兩。冬三兩。

大黃

春三兩。夏秋一兩。

兩冬四兩

黃連

春四兩。夏七兩。秋三兩。冬二兩。

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服十丸。服一月病愈。

和劑涼膈散 見第十九

和劑酒煮黃連丸 治伏暑發熱。嘔吐惡心。并治  
膈熱。解酒毒。厚腸胃。

黃連 去鬚十斤 好酒 五斤

右將黃連以酒煮乾。研爲末。滴水丸如桐子大。  
每服三五十丸。空心熱水送下。

六一散 見第四十四

大黃黃連瀉心湯 治太陽病。發汗遂發熱惡寒。因復下之。心下痞。表裏俱虛。陰陽血氣並竭。無陽則陰獨。復加燒針。因胸煩。面色青黃。膚瞶者。難治。若色微黃。手足溫者。易愈。心下痞。按之濡。其脉關上浮者。

大黃 二兩 黃連 一兩 加黃芩  
為伊尹三黃湯

右剉如麻豆。沸湯二升漬之。須臾絞去滓。分溫

再服

六味丸

見第十六

固本丸

葉氏加人參名  
人參固本丸

夫心生血。血生氣。氣生

精。精盛則鬚髮不白。容貌不衰。今人滋補血氣。多用性熱之藥。殊非其治。此方蓋用生地黃能生精血。用天門冬引入所生之地。熟地黃能補精血。用麥門引入所補之地。又以人參能通心氣。使五味併歸于心。

生地黃

洗

熟地黃

洗再蒸

天門冬

去心

麥門冬

去心各一兩

右爲末。煉蜜丸如桐子大。空心溫酒。或鹽湯下。

三十丸。

知藥八味丸

見第五十四

小便淋瀝。脉證第五十六

小便淋瀝。鼻頭色黃。濇小無血。數大何妨。

淋者。淋瀝不淨。瀉者。閉塞不通。其證小便少而數。

花  
雲

少腹弦急痛引于臍。病原論皆謂腎虛膀胱熱之所成也。分有五種。曰石淋。勞淋。血淋。氣淋。膏淋。石淋者。淋而出石也。腎主水。水結則化為石。腎虛為熱所乘。熱則成淋。其病狀。小便則莖裏痛。尿不能卒出。痛引少腹。膀胱裏急。沙石從小便出。甚者塞痛。令人悶絕。宜局方石葦散三氣淋者。腎虛膀胱熱。氣脹所為也。膀胱合與腎為表裏。膀胱熱。熱氣流入于胞。熱則生實。令胞內氣脹。則小腹滿。腎虛

不能制其小便。故成淋。其狀膀胱小便皆滿。尿澁。

常有餘瀝是也。亦曰氣癰。

宜瞿麥湯沉香散之類

膏淋者。淋

而有肥狀。似膏。故謂之膏淋。亦曰肉淋。此腎虛不

能制肥液。故與小便俱出也。

宜鹿角霜丸。經子丸之類

勞淋

者。謂勞傷腎氣而生熱成淋也。腎氣通于前陰。其

狀尿畱莖內。數起不出。引小腹痛。小便不利。勞倦

卽發也。

宜黃耆湯補中益氣湯之類

血淋是熱淋之甚者。則尿

血。謂之血淋。心主血。血之行身。通遍經絡。循環府

熱甚。則散失其常經。溢滲入胞而成血淋也。宜

効散濟生小五種之外。復有寒熱二種。寒淋者。其

病狀先寒戰。然後尿是也。由腎氣虛弱。下焦受冷。

氣入胞。與正氣交爭。寒氣勝則戰寒而成淋。正氣

勝。則戰寒解。方得小便也。宜肉蓯蓉丸熱淋者。三

焦有熱氣。搏于腎。流入于胞而成淋也。其狀小便

赤澁。亦有宿病淋。今得熱而發者。其熱甚。則變尿

血。亦有小便後。如小豆羹汁狀者。畜作有時也。宜

一散本事火府丹導赤散局方八正散之類巢氏之說如此恐未必盡

然大抵皆三焦氣化不及熱迫膀胱令水道涸滯之所成也。勞氣血膏石雖分五種其病機必因勞動火火盛搏氣甚及于血血轉爲膏膏轉爲石自清而濁自薄而厚自柔而堅自無形而漸有形亦熬汁成膏煮水結鹽之義豈真有砂石出水藏哉至若腎虛不能制肥液更可笑也。歷考內經并運氣等篇肝心脾肺腎小腸督脉亦皆有此證三焦

焦膀胱合  
其義始完  
古所未發

膀胱病此者。爲獨多耳。夫三焦膀胱者。素問靈蘭秘典。雖列爲二。在三焦。則曰決竇之官。水道出焉。在膀胱。則曰州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。三焦之下。卽接膀胱。一主藏。一主決。相爲依倚。故靈樞本藏篇云。腎合三焦。三焦膀胱者。腠理毫毛其應。又四時氣篇云。小腹痛腫。不得小便。邪在三焦約。取之太陽大絡。又五癰津液篇云。三焦閉不瀉。津液不化。不得滲膀胱。則下焦脹。又本輪篇云。

丙經五飲入  
手胃經滋精  
上輸于脾  
脾氣散精上  
歸于肺通調  
水道下

膀胱者津液之府也。少陽屬腎。腎上連肺。故將兩  
藏三焦者中瀆之府也。水道出焉。屬膀胱。是孤之  
府也。觀此則知三焦膀胱名雖二而實一。故古人  
刺灸之法多取三焦穴而不取膀胱。義可想矣。所  
謂少陽屬腎者。少陽正指三焦。手少陽非足少陽  
也。卽腎合三焦之變文。腎上連肺者。言以最下之  
腎而相將于最上之肺。凡在兩藏之中者俱在相  
將之內。此所以成一三焦也。况肺主氣而通調水

此則上  
之氣有  
不化則施  
於熱此  
論則微底  
然多

道三焦亦主氣而上下遊行。如是則淋秘又不獨  
下焦爲然。上中下之氣有一不化。則不得如決瀆  
之水而出矣。熱乘津液。則水道不利。水道不利而  
有熱必鬱蒸而外發黃色。見于鼻者。以鼻爲肺竅  
耳。脉濇小者。濇滯微小而不滑利也。徵其正衰而  
無血。數大爲火象。火證見之。又何妨乎。較之無血  
者。是爲易治。

附方

局方石葦散 治腎氣不足。膀胱有熱。水道不通。

淋瀝不宣。出少起數。臍腹急痛。蓄作有時。勞倦  
卽發。或尿如豆汁。或便出砂石。

芍藥

白朮

滑石

葵子

瞿麥

石葦

去毛

木通

各二兩

當歸

去蘆

甘草

王不留行

各一兩

右爲細末。每服二錢。空心煎小麥湯調下。日二

三服。

三因石燕丸 治石淋。因憂鬱氣注下焦。結如食

鹽。小便痛不可忍。或出砂石而後小便通。

石燕

火燒令通赤水中淬三次研極細水飛焙乾

石葦

去毛

瞿麥穗

滑石

各一兩

右爲細末。麴糊丸桐子大。每服十丸。用瞿麥燈心煎湯。食前送下。日二三服。甚卽以石葦去毛。瞿麥穗木通各四錢。陳皮茯苓各三錢。爲末。每

服三錢。以水一盞。煎七分。去滓服。

瞿麥湯 治心經蘊熱。小便赤澀痛。

瞿麥穗

七錢半

冬瓜子

茅根

各半兩

黃芩

去黑心六錢

木通

二錢半

竹葉

一把

滑石

二兩研爲細末分作三帖

葵子

二合

右除滑石外。粗搗篩。分作三劑。每劑用水三盞。

煎二盞。去滓。入滑石末一貼。攪勻。食前溫服。

沉香散 治氣淋。多因五內鬱結。氣不舒行。陰滯。

予陽而致壅滯。小腹脹滿。便尿不通。大便分泄。小便方利。

沉香

石葦

去毛

滑石

王不留行

當歸

各半兩

葵子

白芍藥

各七錢半

甘草

橘皮

各二錢半

右爲末。每服二錢。煎大麥湯下。

鹿角霜丸

三因

治膏淋。

鹿角霜

用嫩角連頂骨者。鋸作挺子。長三寸。洗了。用水桶內浸。夏三冬五晝夜。用清水

同入錢內煮之。覺湯少。添溫湯。日夜不絕。候角酥糜為度。輕漉出。用刀刮去皮。如雪白。放在篩子上。候自乾。微火焙之。其汁漫火煎膏。凝即角膠。候角極乾。為細末。即鹿角霜。

白茯苓

秋石

各等分

右為細末。糊丸如桐子大。每服五十丸。米飲下。

兔絲子丸

兔絲子

去塵土。木淘淨。屑浸。控乾。蒸搗焙。

桑螵蛸

炙各半兩

澤瀉

二錢半

右為細末。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。空心

清米湯送下。

黃耆湯 治腎虛變勞淋。結澀不利。

黃耆

二兩

人參

五味子

白茯苓

去皮

旱蓮子

磁石

火煨醋淬

滑石

各一兩

桑白皮

七錢半

枳殼

去瓢炒

黃芩

各半兩

右搗篩。每服三錢匕。水一盞煎七分。服無時。

補中益氣湯 見第三十九

立効散 治小便淋閉作痛有時尿血下焦結熱

瞿麥穗

山梔子

炒

甘草

各三錢

右作一服水二鍾煎一鍾食前服。

濟生小蘗飲子 治下焦結熱尿血成淋

生地黃

四兩

小蘗根

滑石

通草

蒲黃

炒

藕節

淡竹葉

當歸

去蘆酒浸

山梔仁

甘草

各半兩

右咬咀。每服四錢。水一盞煎八分。空心溫服。

肉蓯蓉丸 治冷淋。

肉蓯蓉

酒浸切焙

熟地黄

山藥

石斛

去根

牛膝

酒浸切焙

官桂

去粗皮

檳榔

各半兩

附子

炮去皮臍

黃耆

各一兩

黃連

去鬚七錢半

細辛

去苗葉

甘草

炙各二錢半

右爲末。蜜丸。桐子大。每服二十丸。鹽酒下。

八味丸

見第十六

六一散

見第四十四

本事火府丹 治心經蘊熱小便赤少五淋瀉痛。

黃耆

兩一

生乾地黃

兩二

木通

兩三

右爲末煨蜜丸如桐子大每服五十丸木通煎

湯下

導赤散

見第五十四

局方八正散

見第四十九

醫燈續焰卷六

終

醫燈續焰卷七

錢塘後學潘 楫碩甫証

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人 陳一潛子舍 校

顧濬含章之

大便燥結脉證第五十七

大便燥結。須分氣血。陽數而實。陰遲而澁。

燥結一證。稍有分別。大抵血液少者多燥澁。氣火

血乃諸氣  
由血自各  
產後脫血  
黃仁脈虛  
大有分

盛者多結滯。然而燥則必結。結則必燥。又似難為

分別。但以脈合證。而屬氣屬血。自井然矣。氣火盛

者。為陽。脈必有餘。故數實也。宜局方麻仁丸之類血液少者。

為陰。脈必不足。故遲濇也。宜四物湯東垣導滯通幽湯之類氣血

一判。而再審其因。有風燥。宜五仁丸得効皂莢丸搜風順氣丸之類火

燥。宜大小承氣湯亡血燥。宜四物湯之類產後脫血燥。宜四

物湯加人參黃耆之類嘔吐傷液燥。宜四君子加麥冬五味之類汗後亡

液燥。宜八珍湯十全大補湯之類腎虛液少燥。宜六味丸八

味丸之類

但知有  
得而不知  
寒熱即仲  
方亦妙  
結而實不  
外溫藥下

年血衰燥。

宜四物湯麻仁丸濟生從蓉潤腸丸之類

氣實壅盛結。

宜六磨湯

得効橘杏丸蘇麻粥之類

氣虛不能傳送亦結。

宜黃耆湯之類

氣熱乾

涸結。

宜大承氣湯麻仁丸六一散之類

氣寒凝滯不行亦結。

宜局方半

硫丸根實理中湯之類

但宜以脉辨證以證求因而用藥擬

方。無餘蘊矣。

附方

和劑麻仁丸

治腸胃熱燥大便秘結。

厚朴

去皮薑製炒

白芍藥

枳實

楚炒各半斤

大黃

蒸焙一斤

麻仁

別研五兩

杏仁

去皮尖炒五兩半

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。臨卧溫水下。大便通利則止。

四物湯

見第二十一

東垣導滯通幽湯 治幽門不通。上衝吸門不開。噎塞氣不得上下。大便難。脾胃初受熱中。多有此證。治在幽門。以辛潤之。

當歸身

升麻

桃仁泥

甘草 各一錢

紅花 許少

熟地黄

生地黄 各五分

水二盞。煎一盞。調檳榔末五分。稍熱服。

得効五仁丸 治津液枯竭。大腸秘澁。傳道艱難。

桃仁 杏仁 炒去皮尖 柏子仁 半兩

松子仁 一錢二分半 郁李仁 炒一錢 陳皮 四兩另為末

右將五仁另研如膏。入陳皮末。研勻。煉蜜丸如

桐子大。每服五十丸。空心米飲下。

諸賢曰津液枯傳道屬故陳皮分兩浮於五仁

得効皂角丸

專治有風人藏府秘塞大効。

猪牙皂角

枳殼

去瓢

羌活

桑白皮

檳榔

杏仁

去皮尖另研

麻仁

另研

防風

川白芷

陳皮

去白各等分

右爲末。蜜丸如桐子大。每服三五十九。白湯下。

蜜湯亦可。

聖惠搜風順氣丸

治三十六種風七十二種氣。

諸症  
 此方  
 後風順  
 無風何  
 氣不逆  
 自今人  
 虛實  
 用之也

去上熱下冷。腰脚疼痛。四肢無力。多睡少食。羸瘦。顏色不完黃赤。惡瘡下疳。口苦無味。增寒毛聾。積年癥癖氣塊。丈夫陽事斷絕。女子久無子嗣。久患寒瘧。吐逆瀉痢。變成勞疾。百節酸疼。小兒老人皆可服。補精駐顏。疎風順氣。

車前子 二兩 半 白檳榔 火麻子 微炒去

郁李仁 湯泡去 兔絲子 酒浸焙 牛膝 酒浸

乾山藥 各三 枳殼 去穢 防風 去

獨活

兩各一

錦紋大黃

五錢半  
生半熟

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。酒茶米  
飲任下。百無所忌。早晨臨卧各一服。服一月消  
食。二月去腸內宿滯。三月無倦少睡。四月精神  
強勝。五月耳目聰明。六月腰脚輕健。一年百病  
皆除。老者返少。如服藥。覺藏府微動。以羊肚肺  
羹補之。久患腸風便血。服之除根。如顛語寒澁  
及癱瘓。服之隨卽平復。酒後一服。宿醒消盡。百

病不生。孕婦勿服。

濟生菴蓉潤腸丸 治發汗利小便。亡津液。大腸

秘。老人虛人皆可服。

肉菴蓉

酒浸焙  
二兩

沉香

另研  
一兩

右爲末。麻子仁汁打糊。丸如桐子大。每服七十

丸。空心米飲下。

大承氣湯

見第十七

小承氣湯

見第十七

四君子湯

見第十六

八珍湯

見第十六

十全大補湯

見第十六

六味丸

見第十六

八味丸

見第十六

六磨湯

治氣滯腹急。大便秘澁。

沉香

木香

檳榔

烏藥

枳殼

大黃

各等分

右各件熱湯磨服。

得効橘杏丸 氣秘老人。虛弱人。皆可服。

橘紅

取末

杏仁

去皮尖另研各等分

右和勻。煉蜜丸如桐子大。每服七十丸。空心米飲下。

蘇麻粥 順氣滑大便。

紫蘇子

麻子仁

不拘多少

二味研爛。水濾取汁。煮粥食之。

黃耆湯 年高便秘宜服。

綿黃耆

陳皮

去白各半兩

爲末。每服三錢。用大麻仁一合爛研。以水投取漿水一盞。濾去滓。於銀石器內煎。候有乳起。卽入白蜜一大匙。再煎令沸。調藥末空心服。此藥不冷不燥。其効如神。

六一散

見第四十四

局方半硫丸 年高冷秘虛秘。及痿痺冷氣。

半夏

湯洗七次焙乾為細末

硫黃

明淨者研極細用柳

木槌

殺過

右以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼內杵數百下。丸如桐子大。每服十五丸。至二十丸。無灰溫酒或生薑湯任下。婦人醋湯下。俱空心服。

枳實理中湯

見第十七

癩狂脉證第五十八

癲乃重陰。狂乃重陽。浮洪吉兆。沉急凶殃。

癲者。顛也。謂發時顛倒。異于平日。語言錯亂。喜怒無因。或笑或歌。或悲或泣。神迷意惑。穢絮妄知。平日能言。發反沉默。平日沉默。發反多言。甚或行步不休。或復僵仆不起。俗呼爲失心風。狂者。剛暴猖狂。叫號罵詈。甚則踰垣上屋。蹈火赴湯。不避死生。不知饑飽。倍常勇力。若邪所憑。俗呼爲發狂。二者證旣不同。因當各異。古人多以顛狂混稱。亦疎略

陽之所  
 依倚之  
 理後公重  
 出陽參以  
 注類狂殆  
 論義

矣。蓋人身氣爲陽。血爲陰。府爲陽。藏爲陰。府之手  
 足六經爲陽。藏之手足六經爲陰。形質可見者爲  
 陽。神志不可見者爲陰。身半已上爲陽。身半已下  
 爲陰。表爲陽。裏爲陰。凡此陰陽俱各兩相依倚。互  
 爲交通。而後氣血和平。府藏安靜。經脉調勻。形神  
 合一。上下無厭逆之虞。表裏無盛虛之變。如是則  
 微疴小疾亦無自而生。况癩狂乎。今癩云重陰者。  
 謂偏重于陰也。邪入于陰而陰實也。五藏爲陰。神

志舍于五藏亦爲陰。設或抑鬱不伸。謀思不遂。悲哀不置。侘傺無聊。久久藏神凝結。情識昏迷。靈明何有。此癡之成于神志者也。

宜靈苑辰砂散歸脾湯人參琥珀丸之類

一種因陽虛不能衛外。反下陷而附并于陰。附并于陰。則陰氣實。下而不上。則升降紊而癰疾作矣。

卽脉經所謂陽附陰則癰者是也。

宜升陽益氣如補中益氣湯四

逆散之類

一種因三陽經從頭下行。三陰經不得

從足上行而逆下。下則陰經實。亦似陽附陰之義。

但此直指經脉之逆。經所謂癲疾厥狂。久逆之所

生者是也。

宜調其升降。正其逆順。如交感丹。加升麻。巴戟木。香桂枝之類。

一種因

內有畜血。令人如狂。或善忘。或如見鬼。如狂者。如

狂而非狂。卽癲狀也。血者。神明之府。血蓄不行。神

機大礙。故見上證。血爲陰。是亦重陰陰實之義。謂

之邪入于陰亦可。

宜桃仁承氣湯代抵當丸之類。

狂則反是。乃重

陽陽實之證也。素問宣明五氣篇云。邪入於陽則

狂。邪入陽。則陽實。陽實則熱盛。陽性主動。以盛熱

而加以動性。猖狂剛暴。不言可知。又生氣通天論云。陰不勝其陽。則脉流薄疾。并乃狂。并則陽重陽實之義。故素問病能論云。狂生于陽也。又云陽明者常動。巨陽少陽不動。不動而動大疾。此其候也。蓋言陽明之經脉常動。以陽明爲水穀之海。其氣充盛。故常動。巨陽少陽之脉不動。言二經之氣。不如陽明之盛。故不動。不動者。非不動也。不如陽明之常動也。今無論常動者。卽不動者。亦常動而動。

且大疾。是爲狂病之候。觀此。則狂病之爲重陽脫。實明矣。與上文脈流薄疾。并乃狂。若出一義。又靈樞通天篇亦云。陽重脫。易狂。脫非陽脫。言重并于陽分。而若與陰脫離也。又靈樞本神篇云。肝悲哀動中。則傷魂。魂傷則狂。忘不精。肺喜樂無極。則傷魄。魄傷則狂。狂者意不存人。夫肝屬木。性上達而截魂。故魂主升。陽也。悲哀而至于動中。則神情消沮。恍成秋金。而剋木。木受剋。則肝氣傷。肝氣傷。則

魂○無○所○歸○而○欲○其○精○明○不○忘○不○可○得○矣○宜升達如

鬱金香附遠志肺屬金。性收降而戢魄。故魄主降。

茯神木香之類陰也。喜樂而至于無極。則神情渙散。恍成夏火而

剋金。金受剋。則肺氣傷。肺氣傷。則魄無所歸。一派

浮陽動成狂妄。又安能內照而意存人事哉。宜收

天王補心丸朱雀丸加龍骨牡蠣棗仁茯神之類又靈樞經脉篇云。陽明

病至。則惡人與火。聞木聲。則惕然而驚。心欲動。獨

閉戶塞牖而處。甚則欲上高而歌。棄衣而走。夫邪

客陽明。則陽盛熱甚。人則增煩。火則助熱。故惡也。  
聞木聲而驚者。驚其相剋。故惕然心動也。閉戶塞  
牖。卽惡人火之義。甚則欲上高而歌。棄衣而走者。  
以四肢爲諸陽之本。熱實四肢。捷于登躍。故能上  
高而歌。身表爲諸陽之署。熱盛于身。意求涼爽。故  
欲棄衣而走。宜白虎湯承氣湯  
涼膈散紫雲之類又靈樞大惑論云。  
衛氣不得入于陰。常畱于陽。畱于陽。則陽氣滿。陽  
氣滿。則陽躋盛。不得入于陰。則陰氣虛。故目不瞑。

和云不知  
十二經絡開  
動手便錯  
以經絡如  
此分疏精詳  
矣

又曰衛氣留于陰。不得行于陽。留于陰。則陰氣盛。  
陰氣盛。則陰踴滿。不得入于陽。則陽氣虛。故目閉  
也。其中言及二踴者。以二踴之脉。皆上會于目內  
眥。陽脉交于陰。則陰踴盛。故目閉。陰脉交于陽。則  
陽踴盛。故目開。靈樞癰狂篇。首敘目之內外。及上  
下眥者。亦以癰則目閉。狂則目開。而明陰陽之所  
以不同也。是皆不易之理。然而兼痰兼火兼風者。  
常十之五。以三種兼證而較審之。則癰必多痰。而

狂必多火多風也。痰則多滯。九竅。九竅從陰從藏。  
九竅不利。故多癲。風火多淫。四肢。四肢從府從陽。  
四肢盛實。故多狂。陰陽分屬。二說覺更了然。痰宜滾痰

九毒星丸風火宜瀉青丸之類

其脈浮洪者。是爲陽脈。陽狂得之。

與證相宜。卽陰癲得之。亦從陰轉陽。自裏達表之  
象。故勻爲吉兆。若沉而急。沉則入陰。迫裏。急則強  
急不柔。是無胃氣之脈也。不論狂癲。凶殃立至。又  
不獨脈爲然。而證亦不可忽者。故癲狂篇言嘔多

沃沫氣下泄者不治。又言癲癎如狂者不治。蓋嘔  
多沃沫。脾敗氣下泄。腎敗。脾腎二藏爲人之先後  
二天。二藏已敗。自無生理。發如狂者。陰竭于內。陽  
散于外。脫根外越。燈滅忽明之象。亦主死。如是則  
脉與證。又不可不參看也。

附方

靈苑辰砂散 治風痰諸癎。狂言妄走。精神恍惚。  
思慮迷亂。乍歌乍哭。飲食失常。疾發仆地。吐沫。

戴目魂魄不守

辰砂

一兩須光明有墻壁者

酸棗仁

半兩微炒

乳香

半兩光登者

右量所患人飲酒幾何。先令恣飲沉醉。但勿令吐。至靜室中。以前藥都作一服溫酒調之。令頗飲。如飲酒素少人。但以隨量取醉。服藥訖。便安置床枕令卧。病淺者半日至一日。病深者至三兩日。令家人潛伺之。鼻息勻調。但勿喚覺。亦不

可驚觸使覺待其自醒。卽神魂定矣。萬一驚寤。不可復治。吳正肅公少時心病。服此一劑。五日方寤。遂瘥。

歸脾湯 治因思氣結。因憂抑鬱。以致脾傷而心下痞悶。寤不得寐。右關脈結而大。或思慮傷脾。不能統血而血衄妄行。或健忘怔忡。驚悸盜汗。或心脾作痛。嗜卧少食。大便不調。或肢體重痛。月經不調。赤白帶下。或思傷脾而患瘡痢等證。

人參

白朮

白茯苓

黃耆

龍眼肉

酸棗仁 各二錢

遠志

當歸 各一錢

木香

甘草

各五分

右加薑棗煎服。

人參琥珀丸

治失神狂亂。哀樂無由。驚悸不時。

夜不能寐。一切恍惚不寧等證。

人參

去蘆

琥珀

另研

茯神

去木

白茯苓

去皮

石菖蒲

節密小者

遠志

各半兩酒浸半日去

心

乳香

另研

硃砂

另研水飛

酸棗仁

溫酒浸半日去殼紙上炒令香熟各二錢半

右爲細末。煉蜜丸。桐子大。每服二十丸。食後溫

酒下。日再服。如不能飲。棗湯下。

補中益氣湯

見第三十九

仲景四逆散 傷寒論云。少陰病四逆。其人或欬

或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。四

逆散主之。

甘草 炙

枳實 破水漬  
炙乾

柴胡

芍藥

右四味各十分。搗篩。白飲和服。方寸匕。日三服。

申先生交感丹 補虛損。固精氣。烏鬚髮。此鐵甕

城申先生方也。久服令人有子。

蒼朮 刮淨一斤分作四分用酒  
米泔鹽湯各浸七日晒研

川椒紅 炒研 小茴香 各四兩  
炒研

心腎  
此為  
也此  
任用蒼  
連中極  
有服法

症曰中痞則  
下不交瘕  
通而水得  
升火得降與  
相感而能開  
之裏同

又交感丹 凡人中年精耗神衰。蓋由心血少。火  
不下降。腎氣憊。水不上升。致心腎隔絕。榮衛不  
和。上則多驚。中則塞痞。飲食不下。下則虛冷遺  
精。愚醫徒知峻補下田。非惟不能生水滋陰。而  
反見衰悴。但服此方半年。屏去一切暖藥。絕嗜  
慾。然後習秘固并流之術。其效不可殫述。俞通  
奉年五十一。遇鐵甕城申先生。授此服之。老猶  
如少。年至八十五。乃終也。因普示羣生。同登壽

域。

袪神

去皮木四兩

香附子

一斤新水浸一宿石上擦去毛炒黃

爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。侵晨細嚼以降

氣湯下。

降氣湯

香附子

如上法半兩

袪神

二兩

炙甘草

一兩半

爲末。點沸湯服前藥。

仲景桃仁承氣湯

見第二十

代抵當丸

見第二十

逍遙散

見第五十一

天王補心丸

見第五十一

朱雀丸

見第五十一

仲景白虎湯

見四十三

仲景大承氣湯

見第十七

小承氣湯

見第十七

涼膈散

見第十九

紫雪 治發班咽痛及暑中三陽脚氣煩躁。

升麻

錢六

黃金

兩十

寒水石

石膏

各四兩  
八錢

犀角

羚羊角

各一兩

玄參

一兩  
六錢

沉香

木香

丁香

各五錢

甘草

八錢

用水五盞先煮黃金至三盞入諸藥再煎至

盞去滓入芒硝三兩二錢慢火煎以柳木攪不

停手候欲凝入磁盆中更下硃砂麝香末各三

分急攪令勻。候冷凝結成雪。每一錢細細嚥之。

滾痰丸

見第十七

琥珀壽星丸

局方用南星一斤。硃砂二兩。琥珀一兩。無猪心血。

天南星

一斤。掘坑深二尺。用炭火五斤于坑內燒熟。紅取出。炭掃淨。用好酒一升澆之。

將南星趁熱下坑內。用盆急蓋訖。泥壅令經一宿。取出再焙乾為末。

琥珀

四兩  
另研

硃砂

一兩。研悉以一半為衣。

右和勻。猪心血三個。生薑汁打麵糊攪令稠粘。將心血和入藥末。丸如桐子大。每服五十九。用

人參湯。空心送下。日三服。

瀉青丸

見第四十九

癰病脉證第五十九

癰病宜虛。實急者惡。浮陽沉陰。滑痰數熱。

癰之始發。卒然跌仆。手足牽掣。口噤作聲。或吐沫痰涎。一飯頃。氣平甦醒。與癰瘰二證。似是而非。癰證則如上文所云。瘰瘰則多身強直。如弓反張。亦無癰證之作聲也。然有陰陽二種。正如小兒之

癰并於  
癰并於  
癰并於  
癰并於  
癰并於  
癰并於  
癰并於  
癰并於  
癰并於  
癰并於

非石癰之由  
而然也見  
疑二

急驚慢驚。陽癰先身熱。痰癰驚啼而後發。其脉浮

洪。病屬六府。外在肌膚。輕淺易治。

宜集驗龍腦安神丸。河間犀角

丸之類。陰癰身冷。不驚掣。不啼叫。卒然而發。略無先

兆。其脉沉搏。病屬五藏。內在骨髓。深重難治。

宜清心牛

黃丸。神應丹之類。

昔賢皆謂有痰有熱。客于心胃之間。因

聞大驚而作。若熱盛。雖不聞驚亦作。是謂先有痰

熱而後發癰也。恐未必然。總不如三因之論為的。

其論以驚動藏氣不平。夢而生涎。閉塞諸經。厥而

乃成。或在母腹受驚。或感六氣。或飲食不節。逆于  
藏氣而成。蓋忤氣得之外。驚恐得之內。飲食得之。  
屬不內外。所因不同。治法亦異。如驚者。安神丸以  
平之。挾痰者。三聖散以吐之。挾火者。清神湯以涼  
之。可下者。卽以承氣湯下之。其脉總宜虛而不宜  
實。實則邪盛。若實而急。是無胃氣。唯強急而不柔  
和。凶惡之徵也。浮則癰發于陽。沉則癰發于陰。滑  
則癰發多痰。數則癰發多熱。因病見脉。因脉知病。

亦理之自然耳。

附方

龍腦安神丸

見第十九

河間犀角丸

見第二十五

清心牛黃丸

見第四十二

神應丹

治諸癰

好辰砂

不拘多少

右細研猪心血和勻以蒸餅裹劑蒸熟就熱取

出。丸如桐子大。每服一九。人參湯下。食後臨卧俱可。

### 三聖散

瓜蒂

揀淨炒微黃

防風

去蘆各三兩

藜蘆

聖惠方減用之或一

兩或半兩或三錢

右爲麤末。每服約半兩。以薑汁三茶盞。先用二盞煎三五沸。去薑汁。次入水一盞。煎至三沸。却將先二盞同一處熬二沸。去滓澄清放溫。徐徐

喉痺之症類  
喉痛並舉  
諸症相類  
各異狀  
者氣之所  
上下也氣  
天咽喉  
未數之逆

服之以吐爲度不必盡劑。

大承氣湯 見第十七

喉痺脉證第六十

喉痺之脉數熱遲寒。纏喉走馬。微伏則難。

痺者閉也。閉塞不通之謂。乃火盛氣結。以致喉嚨  
腫脹。呼吸難通。壅塞痰涎。水漿不下。一二日。卽能  
殺人。十二經脉。與經別。多過于此。卽不然。亦在其  
前後左右也。有經脉過者。有經別過者。有經脉經

地  
 手會經應  
 古本口頰  
 頰相關  
 清言喉  
 故言咽  
 入差之說  
 為生死惡  
 不可忽  
 左并經之  
 意而後分  
 其甚

別俱過者。如肺手太陰經脉。無過于此者。而經別  
 篇。則云手太陰之正。上出缺盆。循喉嚨。大腸手陽  
 明之脉。循缺盆。上頸貫頰。經別篇又云。上循喉嚨。  
 胃足陽明之脉。循喉嚨。入缺盆。經別篇又云。上循  
 咽。出于口。脾足太陰之脉。上膈夾咽。連舌本。經別  
 篇又云。上結于咽。貫舌中。心手少陰之脉。上夾咽。  
 經別篇又云。上走喉嚨。出于面。小腸手太陽之脉。  
 循咽下。膈。其支者。循頸上頰。而經別則無。膀胱足

太陽之脉。自腦還出。別下項。經別篇又云。直者。從脊上出于項。腎足少陰之脉。循喉嚨。夾舌本。經別篇又云。直者。繫舌本。復出于項。心包絡手厥陰之脉。亦無過此者。而經別則云。手厥陰之正。別屬三焦。出循喉嚨。三焦手少陽之脉。上項繫耳後。而經別則無。經別雖無。其手厥陰之正。有別屬三焦。出循喉嚨者。以三焦與心包爲配。故曰。屬屬則經脉相屬而合一也。膽足少陽之脉。下加頰車。下頸。經

別篇又云。足少陽上夾咽。出頤頷中。肝足厥陰之

脉。循喉嚨之後。上入頤頷。而經別亦無。故靈樞第

十篇。諸經是動所生之病。有云頸腫者。是手陽明有

云。孰。翺。喉痺者。是手陽明有云。頸腫喉痺者。是手陽明

有云。舌本強者。是足太陰有云。舌本痛者。是足太陰

云。噤。乾者。是手少陰足厥陰有云。噤痛頤腫者。是手太陽

有云。頸頷腫者。是手太陽有云。項痛者。是足太陽

咽腫者。是足少陰有云。噤乾及痛者。是足少陰

經書卷之四 經脈 三

腫喉痺者。

手少陽是動

有云領痛者。

足少陽所生

種種不同。

總無外氣火二字。與本篇所云氣有餘。則當脉所

過者熱腫。同一義也。

宜黃芩枳殼連翹升皮薄荷荆芥山梔防風牛蒡玄參黃

蘗黃連山豆根射干升麻生地甘草桔梗石膏等藥在臨症定在何經相宜者用又不可純用寒涼須配輕散者斯善矣然諸證之中。唯喉痺為急。而喉痺中。又

唯以發于手少陰少陽二經者。為最急。蓋喉主天

氣。通呼吸。為生氣之門。火熱搏聚。則腫脹。腫脹則

竅閉。竅閉則氣塞。氣塞則痰涎壅。愈壅愈塞。愈塞

愈塞。呼吸亦將從此而斷。况少陰君火。少陽相火。火性速而炎上。較之他經。不更烈乎。故一二日。即成不治。唯鍼刺出血。以瀉其實。探吐痰涎。以決其壅。皆倉卒治標之妙法也。刺腫處出血。用鷲翎蘸酸澁之味。以探吐。其脉多數。數則爲熱。故耳間有脉遲者。乃是外寒襲經。經氣不利。鬱滯于所過之處。故亦爲痺。外則兼表證。內亦不如數熱之腫痛。此不但忌用寒涼。而且當溫散也。更有一種纏喉風。或麻或癢。又腫又

痛纏綿于內。腫達于外。一種走馬喉痺。須臾之間。痛而腫。腫而閉。閉而氣絕。暴發暴死。如走馬然。二者俱火中挾風。火性烈。風性疾。風火交煽。故發病凶暴如此。此等證唯刺最妙其脉應浮大洪數。而反見微伏。是正衰邪盛。補瀉罔從。欲其生也。不亦難乎。

附方

和劑甘桔湯 治風痰上壅。咽喉腫痛。吞吐有礙。

苦桔梗

雨一

炙甘草

二

每服三錢。水一盞。煎七分。食後溫服。

三因荊芥湯 治咽喉腫痛。語聲不出。嚥之痛甚。

荊芥

半兩

桔梗

二兩

甘草

一兩

右剉散。每服四錢。水一盞。薑三片。煎六分。去滓溫服。

和劑解毒雄黃丸 治纏喉風。及急喉痺。卒然倒

仆。牙關緊急。不省人事。

雄黃

研飛

鬱金

各一兩

巴豆

去皮出油十四枚

右爲細末。醋煮麵糊爲丸。如菉豆大。熱茶清下  
七丸。吐出頑痰立甦。如未再服。如至死者。心頭  
猶熱。灌藥不下。卽以刀尺鐵匙。幹開口灌之。下  
咽無有不活。如小兒驚熱。痰涎壅塞。或二丸三  
丸。量大小加減。一法用雄黃丸三粒。醋磨化灌  
之。尤妙。其痰卽瘥。

寶鑑碧玉散 治心肺積熱。上攻咽喉。腫痛閉塞。  
水漿不下。或喉癰。重舌。木舌。腫脹。皆可服。

青黛

盆硝

蒲黃

甘草

各等分

右爲細末。研勻。每用少許。吹入咽喉內。細細嚥下。若作丸。用砂糖爲丸。每兩作五十丸。每服一丸。嚥化嚥下。

寶鑑開闢散 治喉風氣息不通

白殭蠶

炒去絲嘴

枯白礬

各等分

右爲細末。每服三錢。生薑蜜水調下。細細服之。

瓜蒂散

見第四十八

寶鑑備急如聖散 治時氣纏喉風漸入咽喉。閉

塞水穀不下。牙關緊急。不省人事。

雄黃

研細

藜蘆

白礬

飛

猪牙皂角

去皮  
弦

右等分爲細末。每用一荳大。鼻內噓之。立効。

咽喉急備丹

青黛

芒硝

白殭蠶

各一兩

甘草

四兩

右爲細末。用臘月內牛膽有黃者。盛藥其中。

四十九日。多時爲妙。

寶鑑增損如聖散 治風熱攻衝會浮語聲不出。

咽喉妨悶腫痛

桔梗

二兩

甘草

一兩半

枳殼

湯浸去穢  
二錢半

防風

半兩

右爲細末。每服三錢。水一大盞。煎至七分。去滓。

入酥如棗許。攪勻食後溫服。

瑞竹羅青散 治單雙乳蛾

蒲黃

錢五

羅青

盆硝

研各  
三錢

甘草

錢二

右爲細末。每服一錢。冷蜜水調。細細嚥之。吞不下。雞翎蘸藥喉內掃之。立効。

燒鹽散

治中懸癰垂長。咽中妨悶。

燒鹽枯礬研細。冬等分。和勻。以筋頭點之。卽消。

四七湯

見第十七

四味湯

治咽喉中如有物噤吐不利。

半夏

以生薑汁浸一宿湯浸切洗

厚朴

刮去粗皮以生薑汁

黃浸炙

陳橘皮

以湯浸去白焙各一兩

赤茯苓

刮去黑皮二兩

右剉碎。每服三錢七。水一盞。入生薑一棗大。煎

碎。煎六分。去滓。食遠溫服。

白礬散

治急喉閉。

白礬

錢三

巴豆

三個去殼  
作六辨

右將礬於銚內。慢火熬化爲水。置巴荳其

乾。去巴豆。取礬研爲末。每用少許。吹入喉中。

愈。

醫燈續焰卷七

終